

Perlen der Informatik 6. Übung

Aufgabe G6.1 Konjunktion Diophantischer Gleichungen

Zeigen Sie, daß sich das Problem der Lösung einer Konjunktion von Diophantischen Gleichungen

$$f_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \wedge \dots \wedge f_k(x_1, \dots, x_n) = 0$$

auf das Problem der Lösung einer einzelnen Gleichung reduzieren läßt.

Aufgabe G6.2 Disjunktion Diophantischer Gleichungen

Zeigen Sie, daß sich das Problem der Lösung einer Disjunktion von Diophantischen Gleichungen

$$f_1(x_1, \dots, x_n) = 0 \vee \dots \vee f_k(x_1, \dots, x_n) = 0$$

auf das Problem der Lösung einer einzelnen Gleichung reduzieren läßt.

Aufgabe G6.3 Diophantische Gleichungen in \mathbb{N}

Zeigen Sie, daß sich das Problem der Lösung einer Diophantischen Gleichung in \mathbb{N} auf das Problem der Lösung einer Gleichung in \mathbb{Z} reduzieren läßt. **Hinweis:** Verwenden Sie hierzu ein Theorem von Lagrange, demzufolge sich jede natürliche Zahl als Summe von vier Quadratzahlen darstellen läßt, d.h.

$$\forall x \in \mathbb{N}. \exists u, v, w, z \in \mathbb{Z}. x = u^2 + v^2 + w^2 + z^2$$

Aufgabe H6.1 Diophantische Gleichungen in \mathbb{Z}

Zeigen Sie, daß sich das Problem der Lösung einer Diophantischen Gleichung in \mathbb{Z} auf das Problem der Lösung einer Gleichung in \mathbb{N} reduzieren läßt.

Aufgabe H6.2

Zeigen Sie nun, daß sich das Problem der Lösung mehrerer Diophantischer Gleichungen in \mathbb{N} auf das Problem der Lösung einer Diophantischen Gleichung in \mathbb{Z} reduzieren läßt.